# APHIBANK

## *Rhopalosiphum padi*




Sistema de plantas refúgio.

La caja contiene aproximadamente 500 pulgones de los cereales en trigo de invierno en desarrollo.

### OBJETIVO

Utilizar Aphibank para la producción de las siguientes avispas parásitas en sistemas de plantas refugio:

- Aphidius colemani

### DOSIS Y MODO DE EMPLEO

APLICACIÓN

- Abra la caja inmediatamente tras su recepción.
- Coja el bloque de cereales de la caja y colóquelo en una pieza separada de lana de roca húmeda de 2-3 litros. Se recomienda utilizar una maceta colgante de 20 cm de diámetro.
- Coloque la maceta a la luz directa, por ejemplo, en un lugar iluminado a lo largo del pasillo principal. Se recomienda colocarla en un lugar en el que pueda permanecer 10-12 semanas.
- Introduzca un gotero en el bloque para un suministro continuo de agua y nutrientes. Un momento breve de sequía puede tener consecuencias letales. Proporcione también un drenaje apropiado para evitar cualquier exceso de agua.
- Cuando las raíces comiencen a crecer, desplace el gotero del bloque a la lana de roca.
- Para obtener un resultado óptimo, cuelgue las plantas refugio por encima del cultivo. Esto fomenta el crecimiento y disminuye la vulnerabilidad de las plantas de cereales al mildiu.
- Para que el cultivo no resulte contaminado por la negrilla que se desarrolla sobre la melaza segregada por los pulgones, coloque un cuenco de plástico grande debajo del Aphibank.
- Si se observan pulgones antes que que las plantas refugio produzcan parásitos, aplique Aphipar (como mínimo 0,5 por $m^2$).
- Los pulgones de las plantas refugio son extremadamente sensibles a los insecticidas. Antes de aplicar plaguicidas químicos, saque los bloques del invernadero durante al menos 24 horas. Colóquelos en un lugar donde tampoco puedan penetrar los vapores del plaguicida.
- Si los plaguicidas se aplican vía riego, quite los goteros de los bloques durante aproximadamente 24 horas, ya que los residuos de los plaguicidas desaparecen lentamente del sistema de riego. En estos casos, puede que se tenga que conectar temporalmente a un medio de irrigación alternativo.
- Debido a que los pulgones de los cereales sólo pueden vivir y reproducirse en monocotiledóneas las plantas cultivadas no son atacadas.

CONDICIONES DE MANEJO ÓPTIMAS

Aphibank es efectivo a temperaturas de hasta unos 30ºC.

Servicentre AGRONOMIC VALUE
C/Castelló 80
17485 VILA-SACRA (GIRONA)
T. 972671646 / info@servicentre.es
www.servicentre.es

## ALMACENAMIENTO Y EMBALAJE

Debido a que los organismos beneficiosos biológicos tienen un ciclo de vida muy corto, se deberán introducir en el cultivo lo antes posible tras su recepción. De lo contrario, se podría perjudicar su calidad.

Kopepert no se responsabiliza de la pérdida de calidad si el producto se almacena durante más tiempo o bajo otras condiciones que las recomendadas.

## MODO DE ACCIÓN Y EFECTO VISUAL

En cada bloque de cereales se producirá una población grande pero ligeramente fluctuante de avispas parásitas. Es importante incorporar regularmente nuevos bloques para asegurar una producción constante de grandes cantidades de avispas parásitas. El nivel de infestación de los pulgones permanece bajo debido a la continua presencia de grandes cantidades de avispas parásitas, que buscan activamente pulgones en el cultivo (una situación de "control permanente").

Servicentre
AGRONOMIC VALUE
C/Castelló 80
17485 VILA-SACRA (GIRONA)
T. 972671646 / info@servicentre.es
www.servicentre.es