APHIDEND

Aphidoletes aphidimyza



Mosquito cecidómido.

Botella de 100 ml que contiene pupas negras mezcladas con serrín, de las cuales emergen 2000 mosquitos. También disponible en envases a granel que contienen diez mil mosquitos cecidómidos (500 ml).

OBJETIVO

Un amplio abanico de especies de pulgones. APHIDEND está especialmente recomendado cuando hay colonias de pulgones.

DOSIS Y MODO DE EMPLEO

Las siguientes instrucciones solo tienen un carácter indicativo. Para poder ofrecer un asesoramiento a medida se deberán de tener en cuenta factores locales, tales como el cultivo, las condiciones climáticas y el grado de infestación de la plaga. Para obtener un resultado óptimo, consulte siempre al especialista de Koppert o a un distribuidor de productos Koppert autorizado.

APHIDEND	Dosis	m^2/unidad	Intervalo (días)	Frecuencia	Observaciones
Preventiva	-	-		-	-
Curativa baja	1/m^2	1000	7	Continuamente	Use la botella de 100 ml
Curativa alta	10/m^2	100	7	Continuamente	Use la botella de 500 ml

INTRODUCCIÓN	• Abrir la botella en el invernadero. • Colocar la botella en el suelo o colgada entre las plantas (para protegerla de las hormigas). • Después de eclosionar, los mosquitos son capaces de salir de la botella. • Coloque también la botella de 500 ml (o cuélguela), pero sin esparcir su contenido. • El área de acción de una botella de Aphidend es de 3000 m^2 aproximadamente. Por eso, la botella de 500 ml se usa en introducciones de tres mosquitos cecidómidos por m^2 o más.

ALMACENAMIENTO Y EMBALAJE

Debido a que los productos de control biológico tienen un ciclo de vida (muy) corto, se deberán introducir en el cultivo lo antes posible tras su recepción. Su almacenamiento puede afectar a la calidad y solo debe tener lugar bajo las condiciones abajo indicadas, Koppert B.V. no se responsabiliza de la pérdida de calidad derivada de un almacenamiento más largo del producto y/o bajo unas condiciones inadecuadas.

- Almacenamiento tras la recepción: 1-2 días.
- Temperatura de almacenamiento: 10-15 °C.
- A oscuras.

Altas humedades relativas producen mejores efectos. Para la oviposición, la temperatura nocturna tiene que estar por encima de 16°C

Servicentre AGRONOMIC VALUE
C/Castelló 80
17485 VILA-SACRA (GIRONA)
T. 972671646 / info@servicentre.es
www.servicentre.es

MODO DE ACCIÓN

Los adultos están activos de noche y son atraídos a las colonias de pulgones por el olor de la melaza. Los huevos son depositados en las colonias de pulgones. Las larvas paralizan los áfidos y chupan su contenido.

Los pulgones matados por las larvas cuelgan e la hoja, enganchados por su aparato bucal, se arrugan, pasan a color marrón o negro y se desmoronan.

MORFOLOGIA

- Adultos: tamaño 2,5 mm, frágiles, patas largas.
- Huevos: oblongos, tamaño 0,1x0,3 mm, brillantes, color naranja-rojo.
- Larvas: tamaño 0,3-3 mm, naranja, en colonias de pulgones.
- Pupas: en el suelo

¡IMPORTANTE!

Únicamente use productos que estén permitidos en su país/estado y cultivo. Revise los requisitos de registro fitosanitarios de su país.

Koppert Biological Systems no puede responsabilizarse de un uso no autorizado.

https://www.koppert.es/aphidend/#gallery-3

Servicentre AGRONOMIC VALUE
C/Castelló 80
17485 VILA-SACRA (GIRONA)
T. 972671646 / info@servicentre.es
www.servicentre.es