APHIPAR-M

Aphidius matricariae



Avispa parásita. Presentación en botellas de 100 ml. En estas botellas se encuentran momias mezcladas con serrín, de las cuales emergen 1000 avispas parásitas.

También disponible en envase a granel en frascos que contienen cinco mil avispas parásitas.

OBJETIVO

Especialmente apto para el pulgón del tabaco (*Myzus perscicae nicotianae*) y el pulgón verde del melocotonero (*Myzus persicae persicae*). Este tiene un efecto secundario en el pulgón del algodón.

DOSIS Y MODO DE EMPLEO

Las siguientes instrucciones solo tienen un carácter indicativo. Para poder ofrecer un asesoramiento a medida se deberán de tener en cuenta factores locales, tales como el cultivo, las condiciones climáticas y el grado de infestación de la plaga. Para obtener un resultado óptimo, consulte siempre al especialista de Koppert o a un distribuidor de productos Koppert autorizado.

APHIPAR-M	Dosis	m^2/unidad	Intervalo (días)	Frecuencia	Observaciones
Preventiva	0,25/ m^2	4000	7	-	-
Curativa baja	10/m^2	1000	7	Min. 3x	-
Curativa alta	50/m^2	500	7	Min. 6x	-

INTRODUCCIÓN	• Diseminar el material por las hojas, tablas de lana de roca o en cajas de aplicación (DIBOX). • Asegurarse de que el material permanece unos días en su lugar de introducción.

ALMACENAMIENTO Y EMBALAJE

Debido a que los productos de control biológico tienen un ciclo de vida (muy) corto, se deberán introducir en el cultivo lo antes posible tras su recepción. Su almacenamiento puede afectar a la calidad y solo debe tener lugar bajo las condiciones abajo indicadas. Koppert B.V. no se responsabiliza de la pérdida de calidad derivada de un almacenamiento más largo del producto y/o bajo unas condiciones inadecuadas.

- La eficacia se reduce con altas temperaturas (superiores a 28ºC). Almacenamiento y embalaje.
- Almacenamiento tras la recepción: 1-2 días.
- Temperatura de almacenamiento: 8-10 ºC.
- A oscuras.

Servicentre AGRONOMIC VALUE
C/Castelló 80
17485 VILA-SACRA (GIRONA)
T. 972671646 / info@servicentre.es
www.servicentre.es

MODO DE ACCIÓN

Las avispas parásitas adultas emergen de las momias y las hembras ponen sus huevos en los pulgones. La siguiente generación de avispas parásitas se desarrolla dentro del pulgón, que se convierte en una momia coriácea. La avispa parásita adulta emerge a través de un orificio en la parte posterior de la momia. Las primeras momias se observan en el cultivo unos 10-14 días después de la primera introducción.

Los pulgones parasitados se transforman en momias marrones.

¡IMPORTANTE!

Ajustar las dosis de introducción de este producto según el modo de accioón del producto y los resultados que se pueden esperar en el cultivo dónde se aplique dicho producto. Consultar siempre con un especialista de Koppert o con un distribuidor reconocido de los productos de Koppert para seguir una estrategia apropiada.

Únicamente use productos que estén permitidos en su país/estado y cultivo.

Revise los requisitos de registro fitosanitarios de su país.

Koppert Biological Systems no puede responsabilizarse de un uso no autorizado.

https://www.koppert.es/aphipar-m/#gallery-3

Servicentre AGRONOMIC VALUE
C/Castelló 80
17485 VILA-SACRA (GIRONA)
T. 972671646 / info@servicentre.es
www.servicentre.es