# APHISCOUT



Mezcla de las variedades de **avispas parásitas** *Aphidius colemani* (20%), *Aphidius ervi* (15%), *Aphelinus abdominalis* (15%), *Praon volucre* (40%) y *Ephedrus cerasicola* (10%).

El envase es un tubo de cartón de 90 ml con tampón rociador. El tubo contiene un fieltro con agua con miel para alimentar a las avispas cuando salen.

## OBJETIVO

Los pulgones más habituales. Se recomienda principalmente usar APHISCOUT como producto preventivo o en la fase inicial de una plaga de pulgón.

## DOSIS Y MODO DE EMPLEO

Las siguientes instrucciones solo tienen un carácter indicativo. Para poder ofrecer un asesoramiento a medida se deberán de tener en cuenta factores locales, tales como el cultivo, las condiciones climáticas y el grado de infestación de la plaga. Para obtener un resultado óptimo, consulte siempre al especialista de Koppert o a un distribuidor de productos Koppert autorizado.

| APHISCOUT | Dosis | $m^2$/unidad | Intervalo (días) | Frecuencia | Observaciones |
|---|---|---|---|---|---|
| Preventiva | 0,62/ $m^2$ | 400 | 14 | - | - |
| Curativa baja | 1,25/$m^2$ | 200 | 7 | Min. 3x | - |
| Curativa alta | - | - | - | - | - |

| | |
|---|---|
| INTRODUCCIÓN | • Suelte la capa superior de la etiqueta empezando por la esquina superior derecha.<br>• Cuelgue el bote en sentido horizontal de un tutor, rama o tallo envolviéndole la etiqueta y volviendo a engancharla.<br>• Gire el tapón de modo que los pequeños orificios queden delante de la abertura. |

## ALMACENAMIENTO Y EMBALAJE

Debido a que los productos de control biológico tienen un ciclo de vida (muy) corto, se deberán introducir en el cultivo lo antes posible tras su recepción. Su almacenamiento puede afectar a la calidad y solo debe tener lugar bajo las condiciones abajo indicadas, Koppert B.V. no se responsabiliza de la pérdida de calidad derivada de un almacenamiento más largo del producto y/o bajo unas condiciones inadecuadas.

- Funciona entre 16 y 30 ºC.
- Almacenamiento tras la recepción: 1-2 días.
- Temperatura de almacenamiento: 8-10 ºC.
- A oscuras.

Servicentre AGRONOMIC VALUE
C/Castelló 80
17485 VILA-SACRA (GIRONA)
T. 972671646 / info@servicentre.es
www.servicentre.es

## MODO DE ACCIÓN

Las avispas parásitas adultas emergen de las momias y las hembras ponen sus huevos en los pulgones. La siguiente generación de avispas parásitas se desarrolla dentro del pulgón, que se convierte en una momia coriácea. La avispa parásita adulta emerge a través de un orificio en la momia. Las primeras momias se observan en el cultivo unas 2 semanas después de la primera introducción.

Los pulgones parasitados se convierten en momias con un aspecto ligeramente distinta dependiendo de la especie de avispa parásita.

## ¡IMPORTANTE!

Solo se deben usar productos cuyo uso esté autorizado en su país y para el cultivo en que se apliquen. Controle los requisitos de registro locales. Koppert Biological Systems no se responsabiliza del uso indebido.

Se puede utilizar en combinación con otros agentes de control biológico de pulgones, como Aphidend.

Los pesticidas pueden tener un efecto (in)directo en las soluciones biológicas. Descubra qué pesticidas presentan efectos secundarios con este producto.

https://www.koppert.es/aphiscout/#gallery-3

Servicentre AGRONOMIC VALUE
C/Castelló 80
17485 VILA-SACRA (GIRONA)
T. 972671646 / info@servicentre.es
www.servicentre.es