CHRYSOPA

Chrysoperla carnea

KOPPERT BIOLOGICAL SYSTEMS



Presentación en botella de 500 ml que contiene 1000 larvas (segundo estadio) mezcladas con alforfón.

OBJETIVO

- Pulgones y, en menor grado, otras muchas plagas, como mosca blanca, trips y huevos de polillas.

OBSERVACIONES

- Las crisopas adultas que emergen de las pupas vuelan lejos generalmente y, por lo tanto, no contribuyen al control.
- *Chrysoperla carnea* sólo es efectiva en cultivos bajos.

MORFOLOGIA

Adultos: tamaño ± 12 mm, esbeltos, verdes, alas con venación delgada.

Huevos: verdes, en pelos de 1 cm de longitud.

Larvas: tamaño 2-10 mm, color gris-marrón, grandes mandíbulas pronunciadas, en colonias de pulgones.

Pupa: en un capullo redondo piloso de color blanco

DOSIS Y MODO DE EMPLEO

- Agite la botella o cubo levemente antes de su uso.
- Aplique sobre las hojas infectadas.
- En caso de tratamiento en focos localizados, aplique Chrysopa directamente en las zonas más afectadas.
- El producto se puede aplicar sobre bloques de lana de roca, sobre las hojas, utilizando cajas de aplicación (Dibox) o distribuyéndolo con un Air(o)bug.

La dosis de Chrysopa depende del clima, el cultivo y la densidad de la plaga y siempre se debe adaptar a la situación concreta. Empiece la introducción tan pronto como se detecten las primeras plagas en el cultivo.

CHRYSOPA	Dosis	m^2/unidad	Intervalo (días)	Frecuencia	Observaciones
Preventiva	-	-	-	-	-
Curativa baja	10/m^2	100	-	1x	Sólo en áreas afectadas
Curativa alta	50/m^2	20	-	21x	Sólo en áreas afectadas

Servicentre AGRONOMIC VALUE
C/Castelló 80
17485 VILA-SACRA (GIRONA)
T. 972671646 / info@servicentre.es
www.servicentre.es

ALMACENAMIENTO Y EMBALAJE

Debido a que los productos de control biológico tienen un ciclo de vida (muy) corto, se deberán introducir en el cultivo lo antes posible tras su recepción. Su almacenamiento puede afectar a la calidad y solo debe tener lugar bajo las condiciones abajo indicadas, Koppert B.V. no se responsabiliza de la pérdida de calidad derivada de un almacenamiento más largo del producto y/o bajo unas condiciones inadecuadas.

- Almacenamiento tras la recepción: 1 – 2 días
- Temperatura de almacenamiento: 8 – 10ºC
- A oscuras (botella horizontal)

MODO DE ACCIÓN

Las larvas de la crisopa atacan su presa y succionan sus fluidos corporales.

La presa es succionada y sus pieles arrugadas son difíciles de encontrar. *Chrysoperla carnea* muestra actividad sore todo por la noche. Las larvas se ocultan durante el día.

¡IMPORTANTE!

Ajustar las dosis de introducción de este producto según el modo de acción del producto y los resultados que se pueden esperar en el cultivo dónde se aplique dicho producto. Consultar siempre con un especialista de Koppert o con un distribuidor reconocido de los productos de Koopert para seguir una estrategia apropiada.

Únicamente use productos que estén permitidos en su país/estado y cultivo. Revise los requisitos de registro fitosanitarios de su país.

Koppert Biological Systems no puede responsabilizarse de un uso no autorizado.

https://www.koppert.es/chrysopa/#gallery-3

Servicentre AGRONOMIC VALUE
C/Castelló 80
17485 VILA-SACRA (GIRONA)
T. 972671646 / info@servicentre.es
www.servicentre.es