CRYPTOBUG

Cryptolaemus montrouzieri



Coccinélido depredador (mariquita de dos puntos).

Caja de 1000 ml con 500 adultos.

OBJETIVO

Muchas especies de cochinilla en todos los estadios. CRYPTOBUG está recomendado para ataques crecientes de cochinilla y cuando las cochinillas forman colonias.

OBSERVACIONES

CRYPTOBUG ofrece un control inadecuado en ataques fuertes de *Pseudococcus affinis* en tomate.

DOSIS Y MODO DE EMPLEO

Las siguientes instrucciones solo tienen un carácter indicativo. Para poder ofrecer un asesoramiento a medida se deberán de tener en cuenta factores locales, tales como el cultivo, las condiciones climáticas y el grado de infestación de la plaga. Para obtener un resultado óptimo, consulte siempre al especialista de Koppert o a un distribuidor de productos Koppert autorizado.

CRYPTOBUG	Dosis	m²/unidad	Intervalo (días)	Frecuencia	Observaciones
Preventiva	-	-	-	-	-
Curativa baja	2/m²	13	14	2x	-
Curativa alta	10/m²	2 ½	-	1x	Sólo en áreas afectadas

INTRODUCCIÓN	• Por entre las hojas (afectadas). • Al final de la tarde.

ALMACENAMIENTO Y EMBALAJE

Debido a que los productos de control biológico tienen un ciclo de vida (muy) corto, se deberán introducir en el cultivo lo antes posible tras su recepción. Su almacenamiento puede afectar a la calidad y solo debe tener lugar bajo las condiciones abajo indicadas. Koppert B.V. no se responsabiliza de la pérdida de calidad derivada de un almacenamiento más largo del producto y/o bajo unas condiciones inadecuadas.

- Almacenamiento tras la recepción: 1-2 días.
- Temperatura de almacenamiento: 10-15ºC.
- A oscuras.

CONDICIONES AMBIENTALES

La temperatura tiene que ser superior a los 16ºC.

Servicentre AGRONOMIC VALUE
C/Castelló 80
17485 VILA-SACRA (GIRONA)
T. 972671646 / info@servicentre.es
www.servicentre.es

MODO DE ACCIÓN

Los escarabajos depredadores y las larvas se comen las cochinillas completamente.

Las cochinillas son devoradas completamente. La actividad de *Cryptolaemus montrouzieri* también viene indicada por la presencia de bolsas de huevos vacías. También puede verse larvas, y se asemejan superficialmente a cochinillas grandes.

MORFOLOGIA

Adultos: tamaño 4 mm, color rojo-marrón, élitros marrones oscuro.

Huevos: blancos, oblongos, en colonias de cochinilla

Larvas: tamaño hasta 13 mm, cuerpo cubierto de filamentos céreos, se asemejan al huésped, pero son más robustos y móviles.

Pupas: en lugares ocultos en el envés de las hojas o en uniones de venas.

¡IMPORTANTE!

Ajustar las dosis de introducción de este producto según el modo de acción del producto y los resultados que se pueden esperar en el cultivo dónde se aplique dicho producto. Consultar siempre con un especialista de Koppert o con un distribuidor reconocido de los productos de Koppert para seguir una estrategia apropiada.

Únicamente use productos que estén permitidos en su país/estado y cultivo.

Revise los requisitos de registro fitosanitarios de su país.

Koppert Biological Systems no puede responsabilizarse de un uso no autorizado.

https://www.koppert.es/cryptobug/#gallery-4

Servicentre AGRONOMIC VALUE
C/Castelló 80
17485 VILA-SACRA (GIRONA)
T. 972671646 / info@servicentre.es
www.servicentre.es