MONACO BERMUDAGRASS

MONACO
BERMUDAGRASS

PASTO MONACO BERMUDA:

Exclusivamente de Barenbrug, Monaco continúa el legado fundado por Riviera. El más reciente lanzamiento al mercado del programa de propagación de semillas de Johnston, Monaco, Cynodon dactylon var. dactylon, es una variedad sintética producida por el entrecruzamiento de cinco líneas clonales parentales. Todas las semillas son exclusivamente producidas de la generación Syn-1, resultando en una integridad genética y calidad de semillas superior año tras año.

Monaco es un pasto de bermuda de semillas superiores, excelente para usar en campos de golf y céspedes de una calidad más alta. Tiene una densidad y tolerancia al desgaste excelente. Es generado genéticamente para obtener un color verde más oscuro, también se pone verde más rápido en la primavera, tiene una buena retención del color en el otoño y resiste el invierno. ¡Monaco será una gran adición a su paisaje!



VENTAJAS DE MONACO:

- **Se pone verde más rápido en la primavera**
- **Buena retención del color durante el otoño**
- **Excepcional resistencia al invierno**
- **Densidad excelente**
- **Excepcional tolerancia al desgaste**
- **Color verde genéticamente más oscuro**

YELLOW JACKET BIOSTIMULATOR®

El Yellow Jacket Biostimulator® estimula las gramíneas jóvenes en su desarrollo inicial, asegurando un inicio sano de su crecimiento hasta ser plantas maduras y sanas.

YELLOW JACKET®
ENHANCED SEED TECHNOLOGY

Las semillas tratadas con el Yellow Jacket Biostimulator® contienen las hormonas de plantas citoquinina y auxina, bio-estimulantes y enzimas que favorecen el metabolismo de las plantas. Estas hormonas, enzimas y bio-estimulantes son proporcionados por ingredientes naturales y fomentan la formación de capas de hierba resistentes que se desarrollan rápidamente y de una manera sana. Tanto la hormona de planta citoquinina como la auxina son esenciales para la formación y división de células (= crecimiento); ambos estimulan el crecimiento de la raíz y el desarrollo de los brotes, fomentando el crecimiento y establecimiento de las gramíneas jóvenes.

Las semillas mejoradas con el Yellow Jacket Biostimulator® ofrecen las siguientes ventajas:

- ✓ **Mejor desarrollo de la raíz, favoreciendo:**
  - ✓ una germinación más rápida
  - ✓ una absorción de nutrientes eficiente para un óptimo desarrollo inicial
  - ✓ una absorción de agua eficiente para una mayor resistencia a la sequía
- ✓ **Mejor desarrollo de los brotes, favoreciendo:**
  - ✓ una fotosíntesis eficiente
  - ✓ un establecimiento más rápido
- ✓ **Mejor resistencia contra enfermedades**

BARENBRUG

MONACO BERMUDAGRASS

MONACO
BERMUDAGRASS

ESTABLECIMIENTO:

Para obtener los mejores resultados con este pasto, Monaco debe ser plantado en áreas totalmente soleadas, cuando la temperatura del suelo llega a 65° F (18° C) o más. El promedio debe ser de 2 a 3 libras de la semilla Monaco por 1000 pies cuadrados (1 a 1.5 kg/100 metros cuadrados) en un lecho de siembra bien preparado. Cubra las semillas con no más de un 1/4 pulgada (6mm) de tierra. Mantenga una humedad adecuada del suelo alrededor de las semillas a través de irrigar con frecuencia ligeramente.

En la fase inicial del crecimiento se recomienda aplicar 0.5 libras de nitrógeno /1000 pies cuadrados cada dos semanas y aplicarlo por primera vez dos semanas después de la germinación. Continúe este programa durante 60 a 90 días y aplique después 0.75 a 1.5 libras de nitrógeno/1000 pies cuadrados durante cada mes de la temporada del cultivo. El nivel de intensidad en su uso determinará la cantidad necesaria de nitrógeno por mes. Las instalaciones de césped para deporte deberán usar una proporción mayor, mientras que los céspedes residenciales posiblemente prefieren usar una proporción más baja. También se debe observar que en el otoño, cuando Monaco se prepara para su periodo de inactividad, se recomienda aplicar cantidades adicionales de potasio mientras que se reduce el uso de nitrógeno considerablemente.

MANTENIMIENTO:

Empiece a cortar el nuevo pasto aproximadamente 3 a 4 semana después de la germinación, dependiendo de las condiciones en el momento del establecimiento. Se recomienda que la altura mínima del césped sea de una pulgada antes de cortar durante el periodo de establecimiento. Una vez que el césped es maduro, se puede reducir la mínima altura del corte a 3/8 de pulgada. Cuando se reduce la altura del corte se incrementan los cuidados necesarios.

AREA DE ADAPTACIÓN:

Monaco se adapta rápidamente a la zona de transición al sur y a las regiones donde actualmente se cultiva el pasto Bermuda.

TRIAL DATA:

TURFGRASS QUALITY:

RIVIERA	5.9
MONACO	5.9
PRINCESS 77	5.7
YUKON	5.4
KASHMIR	5.2
NORTH SHORE SLT	5.0
LSD= (0.05)	0.7

SPRING GREEN-UP:

MONACO	5.3
RIVIERA	5.2
YUKON	4.9
NORTH SHORE SLT	4.9
PRINCESS 77	4.7
NUMEX-SAHARA	4.6
LSD= (0.05)	0.5

FALL COLOR: (NOVEMBER)

MONACO	5.8
RIVIERA	5.8
NUMEX-SAHARA	5.7
KASHMIR	5.5
PRINCESS 77	5.5
NORTH SHORE SLT	5.3
LSD= (0.05)	0.4

**Data from 2016 NTEP Trials*

BARENBRUG