ENTOMITE-M

Stratiolaelaps scimitus



Ácaro depredador.

Presentación en tubo de cartón que contiene 10.000 o 50.000 ácaros depredadores (en todos los estadios) en vermiculita con turba.

OBJETIVO

Moscas del mantillo Sciaridae, huevos, larvas y pupas, con preferencia por las larvas menores.

OBSERVACIONES

- El ácaro depredador no entra en diapausa.
- El producto ENTOMITE contiene ácaros de la harina (*Tyrophagus putrescentiae*). Este ácaro puede causar leves daños en algunos culticos, particularmente cuando las condiciones de cultivo són húmedas o aparecen gran cantidad de ácaros. Aplicar siempre ENTOMITE en la superficie del suelo, no sobre la planta. Hacer una prueba a pequeña escala antes de su aplicación en cultivos donde no haya experiencias previas o pida consejo a su distribuidor.

DOSIS Y MODO DE EMPLEO

Las siguientes instrucciones solo tienen un carácter indicativo. Para poder ofrecer un asesoramiento a medida se deberán de tener en cuenta factores locales, tales como el cultivo, las condiciones climáticas y el grado de infestación de la plaga. Para obtener un resultado óptimo, consulte siempre al especialista de Koppert o a un distribuidor de productos Koppert autorizado.

ENTOMITE-M	Dosis	m²/unidad	Intervalo (días)	Frecuencia	Observaciones
Preventiva	100/ m^2	100/500	-	1x	-
Curativa baja	200/m^2	50/250	-	1x	-
Curativa alta	500/m^2	20/100	-	1x	-

INTRODUCCIÓN	• Invertir y agitar suavemente la botella antes de usar. • Esparcir el material uniformemente por el suelo o bloques de lana de roca.

ALMACENAMIENTO Y EMBALAJE

- Almacenamiento tras la recepción: 1-2 días.
- Temperatura de almacenamiento: 10-15 ºC.
- A oscuras (botella horizontal)

CONDICIONES AMBIENTALES

El suelo debe estar húmedo, pero no demasiado, con una estructura abierta y una temperatura mínima de 15ºC

Servicentre AGRONOMIC VALUE
C/Castelló 80
17485 VILA-SACRA (GIRONA)
T. 972671646 / info@servicentre.es
www.servicentre.es

MODO DE ACCIÓN

Adultos i ninfas se alimentan de larvas de moscas esciáridas y otros insectos de suelo.

Los ácaros pueden ser vistos en y sobre el suelo, y en la base de los tallos de las plantas, *Hypoaspis* miles apenas se encuentra sobre las plantas. Reducción del nivel de ataque lenta pero continua.

MORFOLOGIA

Adultos: tamaño hasta 1 mm, color marrón.

Larvas/primer estadio ninfal: color blanco.

¡IMPORTANTE!

Ajustar las dosis de introducción de este producto según el modo de acción del producto y los resultados que se pueden esperar en el cultivo dónde se aplique dicho producto. Consultar siempre con un especialista de Koppert o con un distribuidor reconocido de los productos de Koppert para seguir una estrategia apropiada.

Únicamente use productos que estén permitidos en su país/estado y cultivo.

Revise los requisitos de registro fitosanitarios de su país.

Koppert Biological Systems no puede responsabilizarse de un uso no autorizado.

https://www.koppert.es/entomite-m/#gallery-3

Servicentre AGRONOMIC VALUE
C/Castelló 80
17485 VILA-SACRA (GIRONA)
T. 972671646 / info@servicentre.es
www.servicentre.es