ERCAL

Eretmocerus eremicus



Avispa parásita. Presentación en 10 tiras de cartulina, cada una con 5 tarjetas en una caja. El contenido son pupas de mosca blanca parasitadas de la cuales emergen 3000 avispas parásitas.

También disponible en envase a granel en frascos que contienen cinco mil avispas parásitas.

OBJETIVO

Mosca blanca de los invernaderos (*Trialeurodes vaporaroirum*) y del tabaco (*Bemisia tabaco*) en los estadios larvarios segundo y tercero.

OBSERVACIONES

Eretmocerus eremicus es menos sensible a pesticidas que *Encarsia Formosa*.

Un destallado intensivo (en tomate) entorpece el crecimiento de la población de parásitos de la mosca blanca.

DOSIS Y MODO DE EMPLEO

Las siguientes instrucciones solo tienen un carácter indicativo. Para poder ofrecer un asesoramiento a medida se deberán de tener en cuenta factores locales, tales como el cultivo, las condiciones climáticas y el grado de infestación de la plaga. Para obtener un resultado óptimo, consulte siempre al especialista de Koppert o a un distribuidor de productos Koppert autorizado.

ERCAL	Dosis	m^2/unidad	Intervalo (días)	Frecuencia	Observaciones
Preventiva	1 ½ -3 m^2	1000-2000	7-14	-	-
Curativa baja	3-6/m^2	500-1000	7	Min. 3x	Hasta conseguir control
Curativa alta	9/m^2	330	7	Min. 3x	Hasta conseguir control

INTRODUCCIÓN	• Abrir cuidadosamente el envase dentro del invernadero. • Doblar las tiras y arrancar. Empezar a cortar por la parte opuesta al agujero para colgar. • Colgar las tarjetas en las plantas, y si es posible, aproximadamente a 75 cm por debajo del ápice de la planta, no exponer directamente al sol. • No tocar las pupas.

Servicentre AGRONOMIC VALUE
C/Castelló 80
17485 VILA-SACRA (GIRONA)
T. 972671646 / info@servicentre.es
www.servicentre.es

ALMACENAMIENTO Y EMBALAJE

Debido a que los productos de control biológico tienen un ciclo de vida (muy) corto, se deberán introducir en el cultivo lo antes posible tras su recepción. Su almacenamiento puede afectar a la calidad y solo debe tener lugar bajo las condiciones abajo indicadas. Koppert B.V. no se responsabiliza de la pérdida de calidad derivada de un almacenamiento más largo del producto y/o bajo unas condiciones inadecuadas.

- Almacenamiento tras la recepción: 1-2 días.
- Temperatura de almacenamiento: 8-10 ºC.
- A oscuras.

La temperatura media diaria en el invernadero debe ser al menos 20ºC. A temperaturas superiores (por encima de 30ºC) *Eretmocerus eremicus* permanece activo.

MODO DE ACCIÓN

La avispa adulta (hembra) parasita a la larva de la mosca blanca. También se alimenta del huésped.

Las primeras pupas parasitadas pueden verse en el cultivo pasadas unas 2 semanas. La pupa parasitada de la mosca blanca se vuelve amarilla, independientemente de la especie. La avispa adulta emerge de la pupa a través de un agujero redondo.

¡IMPORTANTE!

Ajustar las dosis de introducción de este producto según el modo de accioón del producto y los resultados que se pueden esperar en el cultivo dónde se aplique dicho producto. Consultar siempre con un especialista de Koppert o con un distribuidor reconocido de los productos de Koppert para seguir una estrategia apropiada.

Únicamente use productos que estén permitidos en su país/estado y cultivo.

Revise los requisitos de registro fitosanitarios de su país.

Koppert Biological Systems no puede responsabilizarse de un uso no autorizado.

https://www.koppert.es/ercal/#gallery-3

Servicentre AGRONOMIC VALUE
C/Castelló 80
17485 VILA-SACRA (GIRONA)
T. 972671646 / info@servicentre.es
www.servicentre.es