MACRO-MITE

Macrocheles robustulus



Ácaro depradador.

Presentación en tubo de cartón. Contenido de 50.000 ácaros (todos los estadios) en vermiculita.

OBJETIVO

- Pupas de trips
- Huevos, larvas y pupas de mosquitos de los hongos (*Sciaridae*), preferentemente las larvas más pequeñas.
- Larvas de Lyprauta.

DOSIS Y MODO DE EMPLEO

La dosis de Macro-Mite depende del clima, el cultivo, el sustrato de plantación y la densidad de la plaga y siempre se debe adaptar a la situación concreta. Empiece la introducción previamente o tan pronto como se detecten las primeras plagas en el cultivo. Si desea asesoramiento sobre la mejor estrategia a seguir en su situación, consulte a un especialista de Koppert o a un distribuidor de productos Koppert autorizado.

MACROCHELES	Dosis	m^2/unidad	Intervalo (días)	Frecuencia	Observaciones
	250/m^2	200	-	1x	

introducción	• Invertir ligeramente/agitar antes de usar • Esparcir sobre la tierra o en la maceta de lana de roca • No se deberá colocar el producto en el agujero de plantación tocando el tallo.

CONDICIONES AMBIENTALES

- El suelo debe estar húmedo y enriquecido con mantillo, con una estructura abierta y una temperatura mínima de 15ºC.

CONDICIONES AMBIENTALES

- Caducidad: 1-2 días
- A oscuras.
- Temperatura de almacenamiento: 10-15ºC

MODO DE ACCIÓN Y EFECTO VISUAL

Los adultos y las ninfas de alimentan de pupas de trips y otros insectos del suelo.

Los ácaros se observan sobre la superficie del suelo y alrededor de la base de la planta. Macrocheles nunca es visto en el interior de la planta. Disminuyen los daños provocados por los trips o las lavas de los mosquitos de los hongos.

MORFOLOGIA

- Adultos: tamaño 0,6 – 0,8, color marrón
- Larvas/primer estadio ninfal: de color blanco

Servicentre AGRONOMIC VALUE
C/Castelló 80
17485 VILA-SACRA (GIRONA)
T. 972671646 / info@servicentre.es
www.servicentre.es

OBSERVACIONES

- El ácaro depredador no entra en dispausa cuando los días se hacen más cortos.
- El producto Macrocheles robustulus también contiene ácaros, que no provocan daños conocidos en los cultivos.
- Aplicar los ácaros depredadores sobre la superficie del suelo, no sobre la planta. Si se va a usar en cultivos o variedades sobre los que no se conozcan los efectos, deberá realizar primero una prueba a pequeña escala o solicitar asesoramiento a su proveedor.
- Para lograr un resultado óptimo, recomendamos cubrir las placas con una capa superficial y mantenerla húmeda, colocando, por ejemplo, uno o dos goteadores en dicha capa. Se han obtenido buenos resultados con el producto Biotop de Crustell.



¡IMPORTANTE!

Ajustar las dosis de introducción de este producto según el modo de acción del producto y los resultados que se pueden esperar en el cultivo dónde se aplique dicho producto. Consultar siempre con un especialista de Koppert o con un distribuidor reconocido de los productos de Koppert para seguir una estrategia apropiada.

Únicamente use productos que estén permitidos en su país/estado y cultivo.

Revise los requisitos de registro fitosanitarios de su país.

Koppert Biological Systems no puede responsabilizarse de un uso no autorizado.

https://www.koppert.es/macro-mite/#gallery-4

Servicentre AGRONOMIC VALUE
C/Castelló 80
17485 VILA-SACRA (GIRONA)
T. 972671646 / info@servicentre.es
www.servicentre.es