SPICAL

Neoseiulus californicus



Ácaro depredador.

Presentación grande: botella de 500 ml. Contenido: 25.000 ácaros depredadores (todas las fases móviles) mezcladas con gránulos inertes.

Presentación pequeña: botella de 250 ml. Contenido: 5.000 ácaros depredadores (todas las fases móviles) mezcladas con gránulos inertes.

PRECAUCIONES

La inhibición del producto puede causar sensibilización al mismo en aplicaciones manuales. Se recomienda una mascarilla como medida de protección para el aplicador y toda persona que trabaje cerca de la zona donde se está aplicando el producto.

OBJECTIVO

Arañas rojas (*Tetranychus urticae*), araña roja de los frutales (*Panonychus ulimi*), *Raoiella incica* (Acaro rojo de las palmáceas), *Panonynchus citri* (acaro rojo de los cítricos), araña blanca de los invernaderos (*Polyphagotarsonemus latus*), araña del ciclamen (*Tarsonemus pallides*) y falsas arañas rojas (*Brevipalpus spp.*). Todos los estadios, con preferencia por los más jóvenes. Los ácaros depredadores también viven de otros ácaros y polen, y pueden sobrevivir sin comida unas semanas.

DOSIS Y MODO DE EMPLEO

- Invertir y agitar suavemente la botella antes de usar.
- Rociar el material sobre las hojas.
- Condiciones ambientales.
- *Neoseiulus californicus* tolera altas temperaturas y bajas humedades.

SPICAL	Dosis	m²/unidad	Intervalo (días)	Frecuencia	Observaciones
Preventiva	25/m²	1000	21	-	-
Curativa baja	100/m²	250	-	1x	Uso junto con Spidex
Curativa alta	200/m²	125	-	1x	Uso junto con Spidex

ALMACENAMIENTO Y EMBALAJE

Debido a que los productos de control biológico tienen un ciclo de vida (muy) corto, se deberán introducir en el cultivo lo antes posible tras su recepción. Su almacenamiento puede afectar a la calidad y solo debe tener lugar bajo las condiciones abajo indicadas, Koppert B.V. no se responsabiliza de la pérdida de calidad derivada de un almacenamiento más largo del producto y/o bajo unas condiciones inadecuadas.

- Almacenamiento tras la recepción: 1 – 2 días
- Temperatura de almacenamiento: 8 – 10ºC
- A oscuras (botella horizontal)

Servicentre AGRONOMIC VALUE
C/Castelló 80
17485 VILA-SACRA (GIRONA)
T. 972671646 / info@servicentre.es
www.servicentre.es

MODO DE ACCIÓN

Los ácaros depredadores adultos y ninfas buscan activamente su presa y la succionan hasta secarla.

MORFOLOGIA

Fases móviles: color transparente blanco-naranja a amarillo, forma de gota, potas cortas, igual aspecto que *Neoseiulus cucumeris.*

Huevos: oblongos, de color transparente a blanco, adheridos a pelos de las venas del envés de las hojas.

¡IMPORTANTE!

Ajustar las dosis de introducción de este producto según el modo de acción del producto y los resultados que se pueden esperar en el cultivo dónde se aplique dicho producto. Consultar siempre con un especialista de Koppert o con un distribuidor reconocido de los productos de Koopert para seguir una estrategia apropiada.

Únicamente use productos que estén permitidos en su país/estado y cultivo. Revise los requisitos de registro fitosanitarios de su país.

Koppert Biological Systems no puede responsabilizarse de un uso no autorizado.

Observaciones: Neoseiulus californicus tolera un abanico de pesticidas químicos. Usar siempre SPICAL junto con SPIDEX.

https://www.koppert.es/spical/#gallery-4

Servicentre AGRONOMIC VALUE
C/Castelló 80
17485 VILA-SACRA (GIRONA)
T. 972671646 / info@servicentre.es
www.servicentre.es