# SWIRSKI-MITE PLUS

## *Amblyseius swirskii*



Ácaro depredador.

Presentación: sobres de papel con gancho. Contenido de 250 ácaros depredadores + otros ácaros (todos los estadios) mezclados con salvado. Cada caja contiene 100 o 500 sobres.

### OBJECTIVO

- Puesta de larvas jóvenes de varias especies de trips.
- Huevos y larvas de mosca blanca (tanto *Trialeurodes vaporariornum* como *Bemisia tabaci)*

SWIRSKI -MITE PLUS puede usarse en pimiento, pepino, calabacín, berenjena y ornamentales. Las posibilidades de uso en otros cultivos están sujeto de investigación.

### DOSIS Y MODO DE EMPLEO

- Colgar los sobres en el cultivo.
- Los sobres ya poseen un agujero de salida.
- Coger los sobres por el rectángulo de cartón situado en su parte superior, ya que los ácaros depredadores se dañan fácilmente.

| SWIRSKI-MITE PLUS | Dosis | m²/unidad | Intervalo (días) | Frecuencia | Observaciones |
|---|---|---|---|---|---|
| Preventiva | - | 2 ½ | 28-42 | - | - |
| Curativa baja | - | 2 ½ | 28 | - | - |
| Curativa alta | - | 1 | 28 | - | Junto con otros auxiliares |

### ALMACENAMIENTO Y EMBALAJE

Debido a que los productos de control biológico tienen un ciclo de vida (muy) corto, se deberán introducir en el cultivo lo antes posible tras su recepción. Su almacenamiento puede afectar a la calidad y solo debe tener lugar bajo las condiciones abajo indicadas, Koppert B.V. no se responsabiliza de la pérdida de calidad derivada de un almacenamiento más largo del producto y/o bajo unas condiciones inadecuadas.

- Almacenamiento tras la recepción: 1 – 2 días
- Temperatura de almacenamiento: 10 – 15ºC
- A oscuras (botella horizontal)
- Proporcionar ventilación para prevenir la acumulación de $CO_2$.

Amblyseius swirskii es:

- No susceptible a diapausa, por lo que puede introducirse en invierno.
- Tolerante a altas temperaturas.

Servicentre AGRONOMIC VALUE
C/Castelló 80
17485 VILA-SACRA (GIRONA)
T. 972671646 / info@servicentre.es
www.servicentre.es

## MODO DE ACCIÓN

Los ácaros adultos buscan su presa y la succionan hasta dejar-la seca.

## MORFOLOGIA

Estados móbiles: beige rosado, forma de gotita i patas cortas.

Huevos: oblongo, transparente blanco.

Todos los estadios pueden encontrarse en la vena principal, venas laterales del envés de la hoja y en las flores.

No es posible distinguir Amblyseius swirskii en campo de Neoseiulus cucumeris y Amblyseius californicus.

## ¡IMPORTANTE!

Ajustar las dosis de introducción de este producto según el modo de acción del producto y los resultados que se pueden esperar en el cultivo dónde se aplique dicho producto. Consultar siempre con un especialista de Koppert o con un distribuidor reconocido de los productos de Koopert para seguir una estrategia apropiada.

Únicamente use productos que estén permitidos en su país/estado y cultivo. Revise los requisitos de registro fitosanitarios de su país.

Koppert Biological Systems no puede responsabilizarse de un uso no autorizado.

Observaciones: *Neoseiulus californicus* tolera un abanico de pesticidas químicos. Usar siempre SPICAL-PLUS junto con SPIDEX.

https://www.koppert.es/swirski-mite-plus/#gallery-4

Servicentre AGRONOMIC VALUE
C/Castelló 80
17485 VILA-SACRA (GIRONA)
T. 972671646 / info@servicentre.es
www.servicentre.es